

Апилак Гриндекс таблетки инструкция по применению

Регистрационный номер: ПН014949/01

Торговое название: Апилак Гриндекс

Международное непатентованное или группировочное название: маточное молочко

Состав

1 таблетка содержит:

пчелиное **маточное молочко** лиофилизированное - 10 мг;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 133,1 мг, тальк - 4,4 мг, кальция стеарат – 1,4 мг, крахмал картофельный – 1,1 мг.

Описание

Таблетки на поверхности и на изломе белого или белого с желтоватым оттенком цвета с мелкими желтыми вкраплениями, плоскоцилиндрические.

Фармакотерапевтическая группа

Биостимулирующее средство природного происхождения

КОД АТХ: А13А

Фармакологические свойства

Апилак - пчелиное маточное молочко - представляет собой секрет, вырабатываемый аллотрофическими железами рабочих пчел. В составе Апилака обнаружены витамины, макро- и микроэлементы, аминокислоты, в т. ч. незаменимые, ряд других биологически активных веществ. Обладает «обшетонизирующим» действием, стимулирует клеточный обмен.

Показания к применению

В период реконвалесценции после перенесенных заболеваний, при нарушении лактации (гипогалактия) в послеродовой период . В качестве вспомогательного средства при лечении невротических расстройств и артериальной гипотензии

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, к продуктам пчеловодства; болезнь Аддисона, возраст до 18 лет (из-за отсутствия достаточного количества клинических данных).

Беременность и период кормления грудью

Применение возможно после консультации с врачом.

Способ применения и дозы

Сублингвально, взрослым по 1 таблетке (10 мг) 3 раза в сутки.

Длительность курса лечения составляет 10-15 дней. Таблетку следует положить под язык и оставить до полного рассасывания.

Побочное действие

Аллергические реакции; расстройства сна.

При появлении аллергических реакций необходимо прекратить прием препарата.

При нарушениях сна следует уменьшить дозу или отменить препарат.
При появлении побочных действий проконсультируйтесь с врачом.

Передозировка

До настоящего времени сведения о случаях передозировки не поступали.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не известны.

Форма выпуска

Таблетки подъязычные по 10 мг.

По 25 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

АО «Гриндекс». Ул.Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия

Тел.: +37167083205

Факс: +37167083505

Электронная почта: grindeks@grindeks.lv

Организация, принимающая претензии: представительство в Москве

Адрес представительства: 117556, Москва, Варшавское шоссе, д. 74, корп. 3, 5 этаж

Тел. в Москве (495) 7716505